



BRAZILIË

Voor Brazilië gelden volgens de Landenlijst van het LCR¹ o.a. de volgende adviezen:

Ziekte	Omschrijving
Difterie	Vaccinatie is aanbevolen.
Tetanus	Vaccinatie is aanbevolen.
Polio	Vaccinatie is aanbevolen bij reizigers met verhoogd risico (zie protocol). In ieder geval aanbevolen bij verblijf > 3 maanden.
Hepatitis A	Malaria komt in bepaalde gebieden gedurende het hele jaar voor. Voor deze gebieden wordt het gebruik van antimuggen middelen en/of antimalariamiddelen aanbevolen.
Hepatitis B	Vaccinatie is aanbevolen bij een verblijfsperiode ≥ 3 maanden.
Malaria	Vaccinatie is aanbevolen voor een groot gedeelte van het land en bovendien wettelijk verplicht indien u uit een endemisch gele koorts gebied komt.
Buiktyfus	
Gele Koorts	

Voor voorlichting, preventie en vaccinatie op maat, kunt u het beste tijdig, bijvoorbeeld 6 tot 8 weken voor vertrek, contact opnemen met de dichtstbijzijnde GGD, Travel Clinic, Tropicentrum, vaccinatiecentrum of een in reizigersadviesing gespecialiseerde huisarts. Ook bij een 'last minute' reis is het belangrijk om u te laten informeren over de mogelijke vaccinaties, malariapreventie e.d. Omdat de hier genoemde adviezen aan wijzigingen onderhevig zijn, kan hieraan geen aansprakelijkheid worden verbonden.

Voor meer informatie: www.gezondopreis.nl of www.lcr.nl

Aan onderstaande informatie is de grootst mogelijke zorg besteed. GSK kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan onderstaande informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

¹ Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadviesing. Protocollen reizigersadviesing. Amsterdam, 2011