



ZUID-AFRIKA

Voor Zuid-Afrika gelden volgens de Landenlijst van het LCR¹ o.a. de volgende adviezen:

Ziekte	Omschrijving
Difterie Tetanus Polio	Vaccinatie is aanbevolen.
Hepatitis A	Vaccinatie is aanbevolen bij verblijf onder onhygiënische omstandigheden.
Hepatitis B	Vaccinatie is aanbevolen bij reizigers met verhoogd risico (zie protocol). In ieder geval aanbevolen bij verblijf > 3 maanden.
Malaria	Malaria komt in verschillende gebieden en in verschillende periodes van het jaar voor. Het gebruik van antimuggen middelen en/of antimalariamiddelen wordt aanbevolen.
Gele Koorts	Indien u uit een endemisch gele koorts gebied komt, is vaccinatie tegen gele koorts verplicht voor dit land. Ook wanneer er sprake is van alleen een transit.

Voor voorlichting, preventie en vaccinatie op maat, kunt u het beste tijdig, bijvoorbeeld 6 tot 8 weken voor vertrek, contact opnemen met de dichtstbijzijnde GGD, Travel Clinic, Tropicentrum, vaccinatiecentrum of een in reizigersadviesing gespecialiseerde huisarts. Ook bij een 'last minute' reis is het belangrijk om u te laten informeren over de mogelijke vaccinaties, malariapreventie e.d.

Omdat de hier genoemde adviezen aan wijzigingen onderhevig zijn, kan hieraan geen aansprakelijkheid worden verbonden.

Voor meer informatie: www.gezondopreis.nl of www.lcr.nl

Aan onderstaande informatie is de grootst mogelijke zorg besteed. GSK kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie. Aan onderstaande informatie kunnen er geen enkele wijze rechten worden ontleend.